

Leverbiopsie

Maatschap Interne Geneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Leverbiopsie

Om de precieze aard van een ziekte te kunnen vaststellen, is het soms nodig om een stukje weefsel (een biopt) uit uw lever weg te halen.

In deze folder staat de gang van zaken bij het onderzoek in grote lijnen beschreven. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze voor het onderzoek stellen aan de polikliniek Interne Geneeskunde.

Zwangerschap

Ook bij zwangerschap is een leverbiopsie mogelijk, maar dan zal dit onderzoek alleen bij uitzondering worden aangevraagd.

Vorbereidingen


- Overleg met uw behandelend arts welke medicijnen u gewoon door kunt blijven gebruiken en welke medicijnen tijdelijk gestopt moeten worden (bijvoorbeeld bloedverdunners en pijnstillers). Paracetamol mag u wel blijven gebruiken.
- Voor het onderzoek wordt een stollingsonderzoek verricht om te kijken of uw bloed voldoende snel stolt. Dit om de kans op een nabloeding te beperken.

De dag van het onderzoek

- Op de dag van het onderzoek dient u vanaf 00.00 uur nuchter te blijven tot 1 uur na het onderzoek.
- Voor het nemen van een leverbiopt wordt u op de afdeling dagverpleging (D2) opgenomen. De verblijfsduur op de dagverpleging is afhankelijk van de voortgang tijdens en na de punctie.
- De verpleegkundige op de dagverpleging neemt een aantal gegevens met u door en tevens worden uw bloeddruk en pols gemeten. Het kan zijn dat er nog wat bloed wordt afgenomen.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Dagverpleging (D2) en het duurt ongeveer 10 minuten.



Bij een leverbiopsie verwijdert de internist met behulp van een speciale naald een stukje weefsel uit de lever voor onderzoek.

Het gebied van de biopsie wordt daarom van tevoren plaatselijk (lokaal) verdoofd.

De stukjes weefsel worden opgestuurd naar de patholoog voor verder onderzoek.

Na het onderzoek

- Tot 3 uur na het onderzoek moet u plat op uw rechterzijde blijven liggen in verband met een eventuele nabloeding. Daarna houdt u in ieder geval de eerste 4 à 6 uur bedrust.
- De punctieplaats en de bloeddruk worden meerdere malen gecontroleerd.
- Tot 1 uur na het onderzoek moet u nuchter blijven.
- Wij adviseren u iemand te vragen om u op te komen halen.
- Na één dag kunt u weer werken of sporten.

Complicaties

De lever is een rijk doorbloed orgaan. Hierdoor bestaat de kans dat er door de biopsie een bloeding optreedt. Om dit in de gaten te kunnen houden is opname dan ook noodzakelijk.

Daarnaast kunt u pijn in uw schouder krijgen kort na de ingreep. Dit is meestal niet ernstig.

Ter plaatse van de biopsie kan de buikwand nog enkele dagen gevoelig zijn. Als pijnstiller kan dan paracetamol gebruikt worden.

De uitslag

De uitslag van het laboratorium komt na ca. 7 – 10 dagen binnen. Uw behandelend arts stelt u zo spoedig mogelijk op de hoogte van de resultaten van het onderzoek. Meestal is dit tijdens de volgende afspraak op de polikliniek.

Bij klachten

Bij ernstige klachten na de ingreep kunt u contact opnemen met het ziekenhuis: tel nr. 010 – 258 5000 en dan vragen naar de dienstdoende assistent interne geneeskunde.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of overdag telefonisch contact opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde tel: **010 - 258 59 30** (van 08.00 uur - 12.30 uur en 13.30 uur - 16.15 uur).

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico's, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.